



ПАЦИЕНТ /Жч/ **Ричи**, чихуахуа, около 3 кг 13 год ДАТА 01.05.2025г.  
СОБСТВЕНИК **Вероника Вълчева**, clinic ID# **93423**

## Ехографско изследване на коремни органи

**Ричи е изследван в дорзална позиция, без допълнителна седация**

### Пикочен мехур

Нормално количество анехогенна урина, без данни за седимент и/или уролити; стената на органа е със запазена слоеста структура и очаквана дебелина.

### Далак

Големина, капсула и топография – запазени.; финозърнеста и ехогенна структура с добре видими далачни вени, но без данни за стаза; субективно размера е очакван, заемайки лявата част на коремната кухина от черен дроб до каудалния полюс на ляв бъбрек.

### Бъбреци/Надбъбречни жлези

Надбъбречни жлези в норма, с добре видими кортекс и медула; размер б.о., с размер в референтните граници

Бъбреци – с нормална форма и големина, с ясна граница между кортекс и медула; бъбречните легенчета са без видими промени; без данни за калцификати и/или цисти, нормален бъбречен хилус. Ехогенността на кортекса е нормална – при сравнение с паренхима на черен дроб и далак.

### Черен дроб

Едрозърнеста, изоехогенна спрямо далачен паренхим структура с видими съдове; леко заострени ръбове; очакван размер – покрива 1/3 от десния бъбрек, което е субективен маркер за размера.



**Жлъчен мехур** Размер – нормален, стена без удебеление; с много млако ехогенен седимент, но без данни за холелити и/или механична обструкция

**Стомах, черва, панкреас** Не увеличена дебелина на стената, запазена перисталтика; нормалната слоеста структура също е запазена. Има единични видими мезентериални лимфни възли. Без данни за илеус; проходим пилор и илеоцекална клапа.

**Панкреас** – не променена ехографска структура (не проминира на фона на околната мазнина, нормална ехогенност), проследим в областта и на лявото и на дясното краче; панкреатиния канал се проследява, не разширен.

**Друго** Липсва свободна абдоминална течност; нормално количество структурна мазнина

### **Ехографско заключение:**

*Без ехографски находки свързани с панкреатит – основното опасение е за патология в областта на панкреас, заради повишена панкреатична липаза на рутинно, скринингово изследване – при нас стойността е 573.42 ug/L (норма до 200).*

*Изпратени са и изследвания за анализ на профила на щитовидната жлеза в референтна лаборатория – Laboklin.*

*Фокусирана ехокардиография – б.о.*

Dr Ranko Georgiev, DVM, EMSAVM/Cardiology: